

**01**

No se deben intercambiar las diferentes vacunas contra la COVID-19 para completar la pauta de vacunación.

**04**

No se debe reiniciar la pauta de vacunación una vez que haya comenzado, aunque se hayan alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado.

**07**

No se debe administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir los efectos secundarios de la vacunación.

**10**

No se debe administrar una vacuna frente a SARS-CoV-2 antes de 7 días de haber administrado cualquier otra vacuna.

**02**

No se debe dejar de vacunar porque haya habido reacciones posvacunales leves en anteriores ocasiones.

**05**

No se debe administrar la vacuna contra la COVID-19 a las personas en cuarentena por contacto estrecho, con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmada hasta que hayan finalizado el aislamiento.

**08**

No se aconseja rechazar un tipo u otro de vacuna porque no se puede elegir qué vacuna administrarse.

**11**

No se debe dejar de vacunar por el hecho de haber pasado la infección.

**13**

No se debe dejar de vacunar a un paciente con cáncer o inmunosupresión por la falta de información específica.

**03**

No se debe dejar de vacunar porque la persona presente enfermedades agudas leves, con o sin fiebre, o porque esté tomando antibióticos.

**06**

No se debe solicitar serología ni antes ni después de la vacunación de forma sistemática.

**09**

No se debe dejar de cumplimentar las medidas de protección general aconsejadas, pese a estar vacunado.

**12**

No se debe desaconsejar sistemáticamente la vacunación por presentar previamente alergias a alimentos o medicamentos.

